

白神ねぎ



○来年に向けた準備を!!

今年の状況は…

- ・春先温暖に推移 ⇒ 病害虫が越冬・早期発生
- ・5月の干ばつ ⇒ 活着不良・生育停滞
- ・本格的な梅雨入り ⇒ さび・べと・小菌核病・葉枯病・黒斑病多発
- ・7/下～8/上の干ばつ ⇒ ネギアザミウマの大発生(稲刈り前後も多発傾向)
- ・10月入りからの気温低下 ⇒ 早期からの黄色斑紋病斑発生、べと・さび病の再発

今年も天候不順に泣かされた年でした。今年状況を踏まえ、次年度に向けた作付け計画が重要となります。

干ばつに対応するため、灌水できる圃場の選択。逆に豪雨・冠水対策として排水対策をとる。

初期の病害虫発生に対する耕種防除として、残渣付近・越冬したねぎ付近へ植えない、連作はしない等の配慮が必要。

一度に多量の枚数を播種しない。取り遅れしないように、ムリのない作付け計画を組む。

また、部会員向けに種子・資材・農薬の予約注文書を配布していますので、病害虫対策を考慮しながら注文下さい。

白神山うど



○山うど栽培について

11月に入り山うど収穫に向けての作業が本格化します。いま一度、栽培基本技術に立ち返って作業に取り組んでいただきたいと思います。

茎葉の刈り取り(11月中旬～)

- ・低温に遭遇し、茎葉が十分黄化して茎が空洞化した頃に茎葉の刈り取り作業を行う。枯れ上がりが遅いほど休眠覚醒までに時間を要するため注意が必要

株の掘り取り(11月下旬～12月中旬)

- ・掘り取り時に土を落とし、霜害に遭わないようその日の内に搬出する。搬出後は、ジベレリンの効果を上げるため、根株の土を洗い流した後、株が白くなる程度

乾かす。

掘り取った株の管理

- ・十分な低温量が確保できなければ休眠不足となり、収穫までの日数がかかったり、不揃いの要因となり収量減少に繋がってしまうため注意
- ・掘り取った株は、低温量確保のためハウス内に置かず、外に野積みしブルーシート等で覆って適温を保ち、氷点下にならないよう保管する。特に、1月出荷用の株については必ず実施する。
- ・保管する際、茎部が腐敗している株は除去する。また、品種が混ざらないよう品種区分し、野ネズミや霜害・凍害に遭わないよう注意する。

伏せ込み床の準備

- ・融雪水がハウス内に入ってこないよう万全な排水対策を行う。

アスパラガス



○アスパラガス栽培について

雪が降る前に、株の掘取りを行ないましょう。

白神きゃべつ



○きゃべつ栽培について

加工きゃべつを栽培されている生産者は、雪が降る前に収穫し、腐らないよう保存して下さい。

11月中旬に、部会員の皆様へ次年度の種子・苗の注文書を配布しますので、次年度の経営計画をしっかりと立てながら、注文書を記入し提出して下さい。また、次年度の新規作付者も募集しています。苗の注文が12月中旬までですので、きゃべつの作付を希望される方は早めにお知らせ下さい。


土壌診断

○土壌診断について

水稻、野菜が終了した圃場で次年度のために土壌診断を行い、土壌の状況を把握するようにしましょう。

土壌診断の目的は、ほ場の栄養分(PH、窒素、リン酸、加里など)を把握し、その分析結果に基づいて、次年度の施肥量を決め、適正な施肥を行うことです。

土壌の採取方法は、地表面3cm程度剥ぎ取り、その下5～10cm程度垂直に掘り取ります。



圃場1箇所につき、左の5箇所を混ぜます。その土を風乾した後で、氏名、圃場番号等わかるようにして、能代、二ツ井、藤里各営農センター又は、能代市農業技術センター(52-2247)へ持参して下さい。

問い合わせ先

能代55-0777、二ツ井73-5193、藤里79-1644