

農業用ドローン・ラジコンボート用 農薬の御注文承ります!

号外

ドローン用農薬

T20(DJI)



日頃、JA購買事業につきましては各段のご利用、ご配慮を承り厚く御礼申し上げます。

予約肥料の【基肥まくモン】ですが予約注文数量を大幅に超えた状況にあります。肥料価格がまだまだ高騰しており、今後当初の予約価格で提供出来ない場合がございます。ご購入を検討されている方は、早急にご注文をお願い申し上げます。

剤型	豆つぶ剤			F G 剤		エアー剤	
	初期剤	初・中期 一発剤		初・中期 一発剤		中・後期剤	
品目名	シヨキニー	ベンケイ	ベツカク	アツバレZ	パッチリLX	シグナス	レプラス
10a当たり散布量	250g	250g	250g	400g	400g	300g	400g
メーカー	クマイ化学			協友 アグリ		日産化学	
商品形態							
規格	250g・2.5kg	250g・2.5kg	250g・2.5kg	4kg	4kg	900g	1.2kg
有効成分	ベントキサゾン.....6.0% プロモブチド.....24.0%	ピリミスルファン.....2.0% フェノキサスルホン.....8.0% ペンゾピシクロン.....12.0%	ピリミスルファン.....2.0% フェノキサスルホン.....6.0% フェンキトリオン.....12.0%	ピラクロニル.....5.0% プロピリスルフロ.....2.25% プロモブチド.....22.5%	ピラクロニル.....5.0% オキサジクロメホン.....0.75% イマズスルフロ.....2.25% プロモブチド.....22.5%	フェントラザミド.....10.0% テフリルトリオン.....6.7% メタゾスルフロ.....2.0%	ジメタメトリン.....2.5% テフリルトリオン.....7.5% メタゾスルフロ.....3.0% ダイムロン.....25.0%
使用時期 (移植水稲)	移植直後～ノビエ1葉期 但し、移植後30日まで	移植後3日～ノビエ3葉期、 移植後30日まで	移植後3日～ノビエ3葉期、 移植後30日まで	移植後3日～ノビエ3葉期、 移植後30日まで	移植直後～ノビエ2.5葉期、 移植後30日まで	移植後1日～ノビエ3葉期 但し、移植後30日まで	移植後14日～ノビエ4葉期 但し、収穫6日前まで
特徴	※高性能な2成分の初期除草剤で、難防除雑草を含む広範囲の雑草に高い効果を示す。 ※ベントキサゾンが、ノビエおよび一年生広葉雑草に長期残効を示す。 ※プロモブチドが抵抗性ホタルイに安定した効果を示す。	※フェノキサスルホンが、ノビエおよび一年生広葉雑草に長期残効を示す。 ※高性能な3成分の初・中期一発剤で、難防除雑草を含む広範囲の雑草に高い効果を示す。 ※ペンゾピシクロン配合により、抵抗性のホタルイに卓効を示し、イボクサ等の畦畔からの侵入雑草を抑制する。	※高年齢のノビエ(3葉期)まで防除可能。 ※フェンキトリオンがホタルイに安定した効果を示す。 ※SU抵抗性オモダカにも高い効果がある。 ※10a当たり250gとドローンに積載するにも軽量で省力的。	※ノビエ(3葉期)をはじめ、様々な雑草に素早く効果を発揮する。 ※多年生雑草に高い効果を示し、長期間抑制することが可能。 ※SU抵抗性雑草(ホタルイ、コナギ、オモダカ)に優れた効果を示す。	※ノビエ(2.5葉期)に安定した効果と長期残効性を持つ。 ※SU抵抗性雑草および、多年生難防除雑草まで幅広く優れた効果を示す。 ※効果の発現が非常に速い特性がある。 ※温度による効果変動が少ない。 ※移植直後処理も可能。	※移植1日後からノビエ3葉期まで使用できる。 ※翌年の発生原因となる多年生の地下部も抑える。 ※直播水稲にも使える。	※落水せず散布でき、移植14日後から使用可能。 ※4つの優れた成分を合理的に配合しているため、ホタルイをはじめ大きくなった問題雑草にも大きな効果を示す。 ※直播水稲にも使える。

TACは「農業者所得の増大」と「農業生産の拡大」をはかることを目的として、生産者に様々な情報を直接届けるための訪問活動の際に、お便り「TAC耳寄り情報」を配布し、営農に関わる情報の他に、金融部門、共済部門からの耳寄りな情報を生産者にお伝えすることに努めています。

TAC 耳寄り情報

ラジコンボート用 農薬



剤型	フロアブル						
	初期 剤		初・中期一発剤				
品目名	メテオ	ピラクロン	カイリキZ	アツバレZ	パッチリLX	シグナス	カウントダウン
10a当たり散布量	500ml	500ml	500ml	500ml	500ml	500ml	500ml
メーカー	北興化学		協友アグリ	協友アグリ		日産化学	バイエル
商品形態							
規格	500ml・2L	500ml・2L	500ml・2L	500ml・2L	500ml・2L	500ml・2.5L	500ml・2L
有効成分	ベントキサゾン.....5.0%	ピラクロニル.....3.6%	イプフェンカルバゾン.....4.8% プロピリスルフロ.....1.75% テフリルトリオン.....4.8%	ピラクロニル.....3.7% プロピリスルフロ.....1.7% プロモブチド.....16.8%	ピラクロニル.....3.7% オキサジクロメホン.....0.56% イマズスルフロ.....1.7% プロモブチド.....16.3%	フェントラザミド.....6.0% テフリルトリオン.....4.0% メタゾスルフロ.....1.2%	フェントラザミド.....5.7% フェンキトリオン.....5.7% トリアファモン.....0.95%
使用時期 (移植水稲)	植代後～移植前7日 又は移植直後～ノビエ1葉期 但し、移植後30日まで	植代後～移植7日前 又は 移植直後～ノビエ1.5葉期 但し、移植後30日まで	移植後3日～ノビエ3葉期 但し、移植後30日まで	移植後3日～ノビエ3葉期 但し、移植後30日まで	移植直後～ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで	移植後1日～ノビエ3葉期 但し、移植後30日まで	移植直後～ノビエ3.5葉期 但し、移植後30日まで
特徴	・1成分の初期除草剤。 ・ノビエ他主要な水田雑草に高い効果があります。 ・土壌吸着が強く、安定した処理層を形成します。 ・WCSに使用可能です。	※1成分でノビエだけでなく、広葉、カヤツリグサ科など幅広い雑草に様々な雑草に効果を示します。 ※効果の発現が非常に速い特性があり、温度による効果の変動が少ない薬剤です。 ※SU抵抗性雑草に対しても同様に幅広い効果を示します。	・3成分の初・中期一発除草剤。 ・ノビエの発生を長期間抑えます。 ・ホタルイ、コナギ、アゼナ等のALS剤抵抗性雑草に対して高い効果を有しています。 ・オモダカ、クログワイなどの難防除雑草に高い効果を示します。 ・イボクサ、クサネム等の特殊雑草に効果があります。	※ノビエ(3葉期)をはじめ、様々な雑草に素早く効果を発揮する。 ※多年生雑草に高い効果を示し、長期間抑制することが可能。 ※SU抵抗性雑草(ホタルイ、コナギ、オモダカ)に優れた効果を示す。	※ノビエ(2.5葉期)に安定した効果と長期残効性を持つ。 ※SU抵抗性雑草および、多年生難防除雑草まで幅広く優れた効果を示す。 ※効果の発現が非常に速い特性があり、温度による効果の変動が少ない薬剤です。 ※移植直後処理も可能。	・移植1日後からノビエ3葉期まで使用できる。 ・翌年の発生原因となる多年生の地下部も抑える。 ・直播水稲にも使える。	・3成分で高い除草効果 ・高年齢ノビエに高い効果、長期残効 ・難防除多年生雑草に高い効果(オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ等) ・多年生雑草の塊茎形成抑制効果 ・SU抵抗性雑草に高い効果(ホタルイ、コナギ、アゼナ等) ・侵入雑草(イボクサ)に有効 ・雑草イネに有効 ・新規需要米(WCS、飼料米等)に高い安全性



商品に関するお問い合わせは 経 済 課 : 0185-55-0777
 直接こちらにご連絡下さい → 能代配送センター : 0185-58-2022
 ニツ井配送センター : 0185-73-2724
 藤里営農センター : 0185-79-1644