

# 稲作農家の皆様 ご注意ください!!

## ラブサイド系農薬(いもち病)の総使用回数が ~~6回~~ → 3回 に変わりました

いもち病の農薬でおなじみの、【ラブサイド剤（フサライドを含む農薬）】の適用内容が変更（平成22年10月27日）になりました。

「稲」への総使用回数が、これまでの「6回以内（穂ばらみ期以降は4回以内）」から → 【3回以内】に変更されました。

育苗期防除で使用した場合も使用回数に含まれますので、本田での個人防除や無人ヘリ防除等を含めての総使用回数が3回を超えないように十分注意してください。

～以上、秋田県をはじめ関係機関が注意喚起しております～

《ラブサイド系の農薬には下記のようなものがあります》

ラブサイド	ブラシン	カスラブサイド	ラブサイドベフラン	ラブサイドトレポンなど、 ラブサイドとの混合剤
-------	------	---------	-----------	----------------------------

【質問例】 ①育苗期にラブサイドを使いました。この後 JA 無人ヘリ能代3回散布を頼んでいるのですが、ラブサイド系農薬の総使用回数は何回になりますか？ ②また、稲こうじ病のラブサイドベフランを散布するつもりですが、散布しても大丈夫ですか？

【①の答え】 下記のとおり、育苗期の分と合わせて合計3回となります。今年のJAの無人ヘリ散布は、3回散布のうち「ラブサイド剤系は2回」となるよう3回目薬剤を非ラブサイド系に変更しておりますので、1回分は個人使用しても大丈夫です。

	育苗期	無人ヘリ1回目	無人ヘリ2回目	無人ヘリ3回目	判定
農業名	ラブサイド	ブラシン	ブラシン	ビーム	○ です
使用回数	①	②	③	—	3 回

【②の答え】 ラブサイドベフランを散布するとすれば下記のとおり4回となり、総使用回数オーバーしますので、今後の散布のいずれかを取りやめる必要があります。

	育苗期	稲こうじ病	無人ヘリ1回目	無人ヘリ2回目	無人ヘリ3回目	判定
農業名	ラブサイド	ラブサイドベフラン	ブラシン	ブラシン	ビーム	× です
使用回数	①	②	③	④	—	4 回

《対応策》 この場合、稲こうじ病ラブサイドベフランを「Zボルドー粉」または「モンガリット粒」に変更するか、無人ヘリを2回散布（2回目・3回目）に変更するなどしてください。

※ JA 無人ヘリでも二ツ井、藤里地区では回数、薬剤が異なりますのでご確認ください ※

【この件のお問合せ先】 営農経済課、 配送センター、 営農センターまで