

# 営農情報



5月は育苗管理や耕起作業、また代かきや田植え作業などで、1年で最も忙しい時期となります。無理をせずに、計画的な作業を心掛けましょう。

田植えを計画的に進め、無理せず安全に作業しましょう。

## 水稲

施肥法	地帯	土壌	基肥量	施肥法	地帯	土壌	基肥量
全層施肥	沿岸部	グライ土	4kg前後	側条組み合わせ	沿岸部	グライ土	側条 2.5kg+全層 1.5kg
		砂質土	6kg前後			砂質土	側条 2.5kg+全層 2.5kg
		泥炭土	6kg前後			泥炭土	側条 2.5kg+全層 2.5kg
	内陸部	グライ土	6kg前後		内陸部	グライ土	側条 3kg+全層 1.5kg
		砂質土	7kg前後			砂質土	側条 3kg+全層 3kg
		泥炭土	8kg前後			泥炭土	側条 3kg+全層 3kg
		黒ボク土	側条 4kg+全層 3kg				

施肥法・地帯・土壌別基肥量(あきたこまち)

使用時期	使用薬剤	使用量	使用回数
田植え3日前～田植え当日	Dr.オリゼダントツ箱粒剤	50g/箱	1回
	Dr.オリゼフェルテラ箱粒剤		
	嵐ダントツ箱粒剤		
播種時～田植え当日	ルーチンバリアード箱粒剤		

※嵐ダントツ箱粒剤を使用した場合、紋枯病の防除も兼ねています。

育苗箱施用(いもち・虫)

使用時期	使用薬剤	使用量	使用回数
植代後～移植前4日 但し移植後15日まで	キルクサ 1kg 粒剤	1kg/10a	1回
	ソルネット 1kg 粒剤	1kg/10a	
植代後～移植前4日 但し移植後30日まで	ピラクロン 1kg 粒剤	1kg/10a	
	農将軍フロアブル	300ml/10a	
	草笛フロアブル		
	ダッシュワンフロアブル	500ml/10a	
ピラクロンフロアブル			

初期防除剤

使用時期	使用薬剤	使用量	使用回数
移植直後～ノビエ 2.5葉期 但し移植後30日まで	バッチリ 1kg 粒剤	1kg/10a	1回
移植直後～ノビエ 3葉期 但し移植後30日まで	トップガン GT1kg 粒剤		
	ヤイバ 1kg 粒剤		
	メガゼータ 1kg 粒剤		
移植後5日～ノビエ 2.5葉期 但し移植後30日まで	スパークスター 1kg 粒剤		
	エーワン 1kg 粒剤		
	ポデーガード 1kg 粒剤		
移植直後～ノビエ 2.5葉期 但し移植後30日まで	ゲットスター 1kg 粒剤	500ml/10a	
	イッポンフロアブル		

一発防除剤

使用時期	使用薬剤	使用量	使用回数
田植え同時(ペースト)	側条オリゼメート顆粒水和剤	500g/10a	1回
	側条オリザスタークル顆粒水和剤		
	パダン SG 水溶剤	200g/10a	
田植え同時(粒状)	コープガード W	40kg～50kg/10a	
	コープガード D		

側条田植え同時防除